

Specifikationer	
Mærke	ProlacSan Probiotic Gel
Produkt Funktion	<b>ProlacSan Probiotic Gel bruges til at genoprette balancen i mundhulens mikroflora ved at tilføje gavnlige orale bakterier.</b> Gelen er baseret på mælkesyrebakterier. Gelen anvendes i tandplejen i mundhulen på væv, der er dækket af slimhinde, herunder tandkødsломmer og tænder. ProlacSan Probiotic Gel hævder ikke at helbrede nogle sygdomme, men kan hjælpe vævet med at normalisere sig ved at give vævet de bedste sundhedsmæssige forhold.
Påstande	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mundhule probiotika.</li> <li>• Styrker bakteriemiljøet i tandkødet og tandkødsломmerne.</li> <li>• Hjælper med at genoprette balancen i den orale mikroflora efter behandlinger som parodontosebehandlinger, antibiotikabehandlinger og kirurgi.</li> <li>• Hjælper med forebyggelse af tandsten.</li> <li>• Hjælper mod dårlig ånde.</li> </ul>
Forholdsregler ved brug	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Må kun bruges på tandlægeklinikker af tandfagligt personale.</li> <li>• Må ikke bruges, hvis sikkerhedsforseglingen er brudt eller mangler.</li> <li>• Afbryd brugen ved tegn på irritation eller overfølsomhed.</li> </ul>
Ingrediensliste (INCI)	Lactobacillus brevis CECT7480, Lactobacillus plantarum CECT7481, Guar gummi E420, Maltodextrin.
Ansvarlig person i EU	CMS Dental, Elmevej 8, 7870 Roslev, Danmark
Oprindelsesland	Fremstillet i Danmark
Engangsbrug	Produktet er til engangsbrug. Overskydende gel skal kasseres efter brug på grund af risikoen for krydskontaminering af patienten.
Oplagring	Opbevares mellem 5°C og 25°C.
Udløbsdato/batchkode	Se produktemballage.
Nominelt indhold	0,12 g pulver pr. sprøjte.

### Anvendelse

ProlacSan Probiotic Gel kommer som et pulver, der skal blandes med vand for at danne en gel, før den er klar til brug, se blandevejledningen. Brug den medfølgende påføringsspids til at påføre gelen på det ønskede behandlingsområde.

#### Behandling

- Anvendes efter depuration og rodplanning (SRP) samt i forbindelse med rutinetjek for at styrke tandkødet.
- Efter depuration og rodplanning (SRP), parodontal behandling eller operation.
- Efter kirurgiske indgreb

#### Brug

- Påfør gelen direkte på de berørte tandkød og/eller tænderne.
- Påfør gelen direkte på de berørte tandkød og/eller tænderne.
- Påfør gelen direkte på operationsområdet.

### Efterbehandling

Patienten bør afstå fra at drikke eller spise i mindst 30 minutter efter proceduren for at opnå fuld effekt af behandlingen. Som opfølgende behandling anbefales de probiotiske ProlacSan sugetabletter.

## Blandevejledning

ProlacSan Probiotic Gel kommer som et pulver, der skal blandes med vand for at danne en gel, før den er klar til brug.

- 1) Træk 1,5 ml demineraliseret vand op i den tomme sprøjte.



- 2) Fastgør luer-lock-konnektor til sprøjten med vand.



- 3) Fjern hættten fra sprøjten med ProlacSan Gel pulver og skru sprøjter sammen.



- 4) For at blande pulver og væske trykkes stemplet på sprøjte med vand i bund.



- 5) Pulveret opløses ved skiftevis at skubbe de to stempler frem og tilbage.  
Gentag denne proces 20 gange.



- 6) Lad systemet hvile i 15 minutter for at danne gelen. Lad systemet være samlet.

- 7) Tryk på et stempel for at samle gelen i en sprøjte og fjern luer-lock-konnektor. Sæt påføringsspidsen på sprøjten. ProlacSan Gel er klar til brug.